

ヒルムシロ科

# イトモ

*Potamogeton berchtoldii* Fieber

兵庫県ランク… B

環境省ランク… NT

## ■ 県内分布


神戸市、西宮市、宝塚市、三田市、猪名川町、三木市、加西市、加東市、たつの市、豊岡市、香美町、丹波篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

## ■ 国内分布

北海道、本州、四国、九州

## ■ 選定理由

人為性	特殊性	学術性
生育環境破壊	特殊生育環境	○ 特殊な分布
観賞用等採取	特異な生態	分布の限界
		希少
		○



## ■ 特記事項

以前確認された場所で確認できなくなっており、減少していると思われる。県内では底面から湧水のある山間のため池でみられることが多い。



写真提供:松岡成久

## ■ 保護上の留意点

ヌートリアによる被害も懸念される。

## ■ 種の概要

池や流水中に生える多年草で、茎も葉も非常に細い。葉はすべて沈水葉で狭線形、長さ2-5cmになり、幅0.7-1.5mmで全縁である。葉の内側に茎を抱く托葉があり、長さ約7mmで、葉のつけ根の反対側では開き、両縁が重なり合っている。6-8月に開花し、総花柄は長さ1-2cm、径約0.4mm。穂状花序は長さ4-5cmで、花をつけない節間の部分が伸びる。