

シソ科

シソバタツナミ

Scutellaria laeteviolacea Koidz. var. *laeteviolacea*

兵庫県ランク… 調
環境省ランク… —

■ 県内分布

西宮市

■ 国内分布

本州(福島県以西)から九州

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊		特殊生育環境		特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	
				希少	○



■ 特記事項

標本からシソバタツナミとされているが、変異や分布について不明な点が多い。

■ 保護上の留意点

—

■ 種の概要

やや湿った山林内に生える多年草。根茎は細くて横にはい、茎は直立して高さ5-15cm、稜上には上向きに曲がった毛がある。葉は2-4対あり、やや三角状の卵形で基部は切形、長さ1.5-4cmになり、幅1-2.5cm、先の方に曲がった毛が両面に生え、表面は光沢があり、裏面はふつう紫色を帯びる。先端は鈍く、縁には粗い鈍鋸歯があつて、葉柄は1-3cm。花期は5-6月。花序は1-6cmで、花冠は紫色、基部でほぼ直角に曲がり、長さ約2cm。萼は腺点と毛があつて長さ約2.5mm、果時に約5mmとなる。