

ラン科

エビネ

Calanthe discolor Lindl.

兵庫県ランク… C

環境省ランク… NT

■ 県内分布


神戸市、西宮市、宝塚市、猪名川町、西脇市、三木市、加西市、多可町、姫路市、市川町、神河町、相生市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、丹波篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

■ 国内分布

北海道(西南部)、本州、四国、九州、琉球諸島

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊		特殊生育環境		特殊な分布	
観賞用等採取	○	特異な生態		分布の限界	
				希少	



■ 特記事項

—

■ 保護上の留意点

—



写真提供: 松岡成久

■ 種の概要

雑木林の下等に生える。葉は2-3個ついて、長さ15-25cm、幅5-8cm。鋭頭、無毛。花茎は高さ20-40cm、4-5月、ややまばらに8-15花をつける。苞は披針形で、膜質、長さ5-10mm。花被片は暗褐色。萼片は狭卵形、鋭頭。側花弁は萼片よりやや狭く、同長。唇弁は萼片と同長、帯紅色または白色で、扇形、3深裂。