

シソ科

ナミキソウ

Scutellaria strigillosa Hemsl.

兵庫県ランク… B

環境省ランク… —

■ 県内分布


芦屋市、姫路市、赤穂市、豊岡市、香美町、新温泉町、南あわじ市

■ 国内分布

北海道、本州、四国、九州

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊	○	特殊生育環境	○	特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	
				希少	○



■ 特記事項

但馬で新しい自生地がみつかってきているが、瀬戸内地方では淡路島にしかみられなくなった。

■ 保護上の留意点

—

■ 種の概要

海岸の砂地に生える多年草。茎は4角で分枝し、毛があり、高さ10-40cm、地下に細長い走出枝がある。葉は長楕円形で先は円く、短い柄があり、長さ1.5-3.5cmになり、幅1-1.5cm、やや厚く、両面にいくらか毛があって、縁には低い鈍鋸歯がある。花は6-9月、上部の葉腋に1個ずつつき、長さ2-2.2cmで、青紫色、基部で折れ曲がってほぼ直立する。萼は花時に長さ3mm、果時では5mm内外となり、分果は長さ約1.8mmで半円形、円い小突起がある。