

イネ科

# ナルコビエ

*Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth

兵庫県ランク… C

環境省ランク… -

## ■ 県内分布


神戸市、尼崎市、宝塚市、三田市、猪名川町、加古川市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、市川町、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、香美町、新温泉町、丹波篠山市、丹波市、淡路市

## ■ 国内分布

本州、四国、九州、琉球諸島

## ■ 選定理由

人為性	特殊性	学術性	
生育環境破壊	特殊生育環境	特殊な分布	
観賞用等採取	特異な生態	分布の限界	
		希少	○



## ■ 特記事項

確認記録は多いが、現存を確認できる生育地は減少している。耕作地周辺の半自然草原にかろうじて現存している。2020年版での新規掲載種。



写真提供:松岡成久

## ■ 保護上の留意点

生育地である草原の保全が重要である。

## ■ 種の概要

草原に生育する多年草で、全体に軟毛がある。高さは50-100cmで、葉身は線形で幅7-15mm。花序には、長さ3-5cm程度の数個の枝をつけ、小穂は長さ5mm程度で、やや鋭頭に終わる。花期は7-10月。