

(H25.10.30ランク変更)

1 植物 (1) 維管束植物

種子植物 -4 単子葉植物

| 科名 | 番号 | 種和名 | 学名 | ランク | 環境省 ランク | 選 定 理 由 | | | | | | 県内分布 | 国内分布 | 種の概要 (形態及び生態的特徴、 生育環境など) | 特記事項 | 保護上の留意点 |
|------|-----|--------|------------------------------------|-----|------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------|--|---|---------|
| | | | | | | 人為性 | | 特殊性 | | 学術性 | | | | | | |
| | | | | | | 生育環境破壊 | 観賞用等採取 | 特殊生育環境 | 特異な生態 | 特殊な分布 | 分布の限界 | | | | | |
| ホシクサ | 562 | クロホシクサ | <i>Eriocaulon parvum</i> Koern. | A | VU | | | | | | | 東播 | 本州、四国、九州 | 湿地にはえる1年草で、茎はごく短い、ときに1-3cmになる。葉は多数、ロゼット状または茎にらせん状につき、線形で長さ4-10cm、3-5脈が格子状になり、先はいちじるしくとがる。花茎は高さ10-20cmになり、5-6肋ですこしねじれる。頭花は球形、藍黒色、径4-5mm、白色の短毛がある。総苞片は倒卵形で鈍頭、乾くと汚白黄色になり、頭花より短い。花床に毛がある。花苞は倒卵状くさび形で、長さ2mm内外、先はとがり、上部の背面に白色の短毛がある。雄花は長さ約1.5mm、萼は合着して先は浅く3裂し、上縁に白色の短毛があり、花弁3個は上部を残して筒状に合着し、裂片の上縁に白色の短毛があり、その内面に黒腺がある。 | 田んぼなどをずっと探しているが、ここしばらく見ない。以前確認された場所(丹波)では消失した。 <u>1969年以降確認されなかったことから2010年版でAランクからExに変更したが、2010年に東播で新たな生育地が確認されたので、Aランクに復活させる。</u> | |

(注)下線部分に変更を示す。