

## 14 ビロードキンクロ

(カモ目)

兵庫県ランク:B

*Melanitta fusca*

繁殖個体群:無 越冬個体群:B 通過個体群:調

環境省ランク:指定なし

### 種の概要

北海道、本州、四国、九州で冬鳥。兵庫県では主に11-翌3月に記録がある。越冬例も稀にある。海上、海岸、河口などに群で生息し、潜水して貝類や甲殻類などを採食する。タンカーや製油所などの事故に起因する重油や化学物質の流出による被害で、海上の群れが大きな打撃を受ける例がある。



写真提供:下土居知子

### 国内分布

北海道、南千島、本州、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、四国、九州、伊豆諸島

### 県内分布 ( )表記の市町では2002年以前に生息確認

神戸市、(姫路市)、(明石市)、西宮市、(加古川市)、(赤穂市)、(南あわじ市)、(淡路市)、たつの市



### 主要な選定理由

影響の人為性				生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の希少性		
個体数激減	分布域激減	餌の可用性の低下	特殊競争圧	特殊捕食圧	特殊繁殖環境	特殊採餌環境	ね特殊ら休息環境・	局地的繁殖	希少


### 県内における生息状況およびその他特記事項

新規追加種。

1950年代までは瀬戸内の海上に100-500羽の大群が越冬していた。1953年1月には明石市二見沖の海上で12,565羽が記録されたことがある。1970年台半ばに急減し、近年は数-数10羽程度の小群が時々記録される程度に減っている。

### 保護上の留意点

浅い内湾で潜水して主に貝類や甲殻類を捕食するので、甲子園浜や新舞子の底生生物の保全が重要。



写真提供:下土居知子