

# 58 ソリハシシギ

(チドリ目)

兵庫県ランク:B

*Xenus cinereus*

繁殖個体群:無 越冬個体群:無 通過個体群:B

環境省ランク:指定なし

## 種の概要

北海道、本州北部、四国では旅鳥、本州南西部、九州、沖縄では旅鳥または冬鳥。兵庫県では主に5-6月と8-10月に見られる。干潟、河口、海岸近くの湿地、水田などに生息し、ゴカイ類、貝類、カニ類、昆虫類などを採食する。



写真提供:松重和太

## 国内分布

北海道、南千島、本州、佐渡、舩倉島、見島、四国、九州、対馬、男女群島、種子島、伊豆諸島、小笠原群島、硫黄列島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

## 県内分布 ( )表記の市町では2002年以前に生息確認

神戸市、姫路市、(尼崎市)、明石市、西宮市、(伊丹市)、豊岡市、加古川市、(赤穂市)、高砂市、南あわじ市、淡路市、たつの市、稲美町、香美町



## 主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の希少性	
個体数激減	分布域激減	餌の可用性の低下	特殊競争圧	特殊捕食圧	特殊繁殖環境	特殊採餌環境	ね特殊ら休息環境・	局地的繁殖	希少

## 県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。  
瀬戸内の沿岸では比較的古くから記録が残されている。ただし、1967年9月に姫路市興浜23羽の記録を除くと大抵は数羽から10羽までの群れである。近年は生息地の消滅に伴い個体数も減少している。県北部でも観察されている。

## 保護上の留意点

現在もわずかに残されている干潟や河口などの自然環境の保全に加えて、積極的な再生のための環境整備が重要。