

(H24. 6. 21ランク変更)

1 植物 (1) 維管束植物

② 種子植物 ②-4 単子葉植物

科名	番号	種和名	学名	ランク	環境省 ランク	選 定 理 由							県 分	内 布	国 分	内 布	種の概要 (形態及び生態的特徴、 生育環境など)	特 記 事 項	保護上の留意点
						人為性		特殊性		学術性									
						生育 環境 破壊	観 賞 用 等 採 取	特 殊 生 育 環 境	特 異 な 生 態	特 殊 な 分 布	分 布 の 限 界	希 少							
ユリ	520	ステゴビル	<i>Caloscordum inutile</i> (Makino) Okuyama et Kitag.	A	VU								但馬	本州	原野にはえる多年草。鱗茎は球形で径10-15mmになる。根出葉は長さ30cm内外で扁平な線形、晩秋に出て冬を越し、夏に枯れ、その後に花茎が出る。花茎は高さ15-30cmで、9-10月、数個の花が散形状につく。花被片は白色、線状披針形で長さ7-8mm、下部が合着し、上部が開出する。雄蕊は6個、花被片より短く、花糸は細く、基部が花被の中部以下に付着する。柱頭が3個、花柱は花後しぼんで曲がる。	1936年以降、確認されていた場所（丹波市青垣町）では確認されていない。2010年版でAランクからExに変更したが、2010年に但馬で新しく発見されたのでAランクに復活させる。			