

## 137 コサメビタキ

(スズメ目)

兵庫県ランク: C

*Muscicapa dauurica*

繁殖個体群:C 越冬個体群:無 通過個体群:無

環境省ランク:

### 種の概要

シベリア南東部から中国北東部、朝鮮半島、サハリン、日本、南アジア北部、インドシナ半島北部などで繁殖する。北方のものは繁殖後は南方に渡る。日本では北海道、本州、四国で繁殖する。九州の一部でも繁殖するところがある。平地から低山の明るい林に生息し、大木の横枝にコケやクモ類の糸を利用して皿形の巣を造る。見通しの良い木の枝に止まって、飛んでいる昆虫類をフライングキャッチする。



写真提供：北野光良

(性別：不明)

### 国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甌島列島、宇治群島、草垣群島、屋久島、伊豆諸島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

### 県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★芦屋市、★伊丹市、相生市、★豊岡市、加古川市、赤穂市、★西脇市、★宝塚市、三木市、高砂市、★川西市、★三田市、★丹波篠山市、★養父市、丹波市、★南あわじ市、朝来市、★淡路市、★宍粟市、たつの市、★猪名川町、多可町、★稲美町、播磨町、★神河町、★香美町、★新温泉町

### 主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ 特殊 ら休 息 環境・	局 地的 繁殖	希 少
					○				○

### 県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に4-10月に生息し繁殖する。広い範囲で観察記録があるが、公表されている繁殖地は少なく、減少傾向にあるとされる。

### 保護上の留意点

繁殖環境である平地から低山の落葉広葉樹林が開発や植林で失われたことが減少要因とされる。本種の保護のためには、平地から低山に残存する落葉広葉樹林の保全に加え、落葉広葉樹林の再生が重要。