

100 ノスリ

(タカ目)

兵庫県ランク: B

Buteo japonicus

繁殖個体群:B 越冬個体群:C 通過個体群:C

環境省ランク:

種の概要

シベリア南部から中国北東部、サハリン、日本などで繁殖し、繁殖後は北方のものは温帯域に渡る。日本では北海道と本州で繁殖するが、四国、九州でも一部繁殖するところがある。一部は繁殖後も繁殖地周辺に生息するが、多くは南方に渡り、越冬する。平地、丘陵地から山地の林に生息する。山間から平地の農耕地や牧場、池沼、河原などの草原でネズミ類、ヘビ類、小型鳥類、昆虫類などを捕食する。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、男女群島、五島列島、甌島列島、宇治群島、草垣群島、上三島諸島、種子島、屋久島、伊豆諸島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島



写真提供：梅津節雄

(性別：不明)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★宝塚市、★三木市、★高砂市、★川西市、★小野市、★三田市、★加西市、★丹波篠山市、★養父市、★丹波市、★南あわじ市、★朝来市、★淡路市、★宍粟市、★加東市、★たつの市、★猪名川町、★多可町、★稲美町、★福崎町、★神河町、★太子町、★佐用町、★香美町、★新温泉町



写真提供：梅津節雄

(性別：不明)

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の希少性	
個体数激減	分布域激減	餌の可用性の低下	特殊競争圧	特殊捕食圧	特殊繁殖環境	特殊採餌環境	ね特殊ら環境・休息	局地的繁殖	希少
					○	○		○	○

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では周年生息し繁殖する。冬期には県内で広く記録されているが、近年、減少傾向にある。繁殖期にも記録はあるが、個体数は少なく、確実な営巣記録は限られている。六甲山地で繁殖している可能性がある。

保護上の留意点

営巣が確認されている場所および繁殖期に生息が確認されている場所では、極力森林を保全し広く残すことが重要。