

キシメジ科

# バカマツタケ

*Tricholoma bakamatsutake* Hongo

兵庫県ランク… 注  
環境省ランク… NT

## ■ 県内分布


神戸市、豊岡市、新温泉町

## ■ 国内分布

三重県、兵庫県、他

## ■ 選定理由

| 人為性    |   | 特殊性    |  | 学術性   |   |
|--------|---|--------|--|-------|---|
| 生育環境破壊 |   | 特殊生育環境 |  | 特殊な分布 |   |
| 観賞用等採取 | ○ | 特異な生態  |  | 分布の限界 |   |
|        |   |        |  | 希少    | ○ |



## ■ 特記事項

コナラやミズナラ林等の広葉樹林に発生。マツタケ臭は本物より強い。局地的に発生し観察例が少ない。最近栽培に成功した。



写真提供：池田晴海

## ■ 保護上の留意点

発生地への保全。

## ■ 種の概要

マツタケにきわめて近縁でやや小さく、傘は径4-10cm。傘の中央部はくり褐色、周辺部は淡色からほとんど白色、最初繊維状、のち表皮は裂けて鱗片となる。肉は白色で厚く緻密、匂いはマツタケに似てさらに強く無味。秋にコナラ、ミズナラ、ウバメガシ等の広葉樹林下に群生。