

キョウチクトウ科

フナバラソウ

Vincetoxicum atratum (Bunge) C.Morren et Decne.

兵庫県ランク… A

環境省ランク… VU

■ 県内分布

阪神、東播磨、西播磨、但馬、丹波

■ 国内分布

北海道、本州、四国、九州

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊	○	特殊生育環境	○	特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	
				希少	○

詳細は非公開

■ 特記事項

現存が確認できる草原は限られている。2020年版でBランクからAランクに変更した。

■ 保護上の留意点

生育地である草原の保全が重要である。



写真提供：松岡成久

■ 種の概要

山野の草原に生えるややまれな多年草。全体に密に軟毛があり、茎は直立して高さ40-80cmになる。葉は楕円形から卵形、長さ6-14cm、幅3-8cm、先は急にとがるかまたはやや円く、基部は円く、8-12cmの葉柄があり、裏面には著しく脈が浮き出している。花序はごく短い総花柄があつてやや密に花をつけ、小花柄は5-10mm、萼とともに密に毛がある。花冠は濃褐紫色で内面無毛、外面は短毛があり、径12-14mm。副花冠は楕円形で蕊柱とほぼ同高。花期は6月。