

アサクサノリ

Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi, M.Miyata, M.S.Hwang & H.G.Choi

兵庫県ランク… LE

環境省ランク… CR

■ 県内分布

現時点で自然集団は確認されていない。

■ 国内分布

北海道南部、本州、四国、九州

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊		特殊生育環境		特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	
				希少	○

■ 特記事項

以前は養殖対象種であり、1950-60年代には広範囲で採集記録がある。以前は*Porphyra* 属に含められていたがSutherland et al. (2011)において学名の変更が提案された。

■ 保護上の留意点

確認された場合は、生育地を保全する必要がある。

■ 種の概要

体は長楕円形から楕円形で、ときに線状披針形のものもあり、基部は楔形から円形で、長さ7-24(-50) cm、幅2-5(-10)cmになる。体の上部は赤褐色を呈し、下部は青緑色を示す。縁辺は全縁で顕微鏡的鋸歯はなく、波皺する。体は1層細胞からなり、厚さ27.5-35μmあり、断面で細胞の高さは幅より大きいかほぼ等しい。葉緑体は各細胞に1個含まれる。雌雄同株体と雄性体がある。