

ホシクサ科

## ホシクサ


*Eriocaulon cinereum* R.Br.

兵庫県ランク… C

環境省ランク… -

### ■ 県内分布

神戸市、西宮市、明石市、稲美町、三木市、小野市、加東市、多可町、市川町、赤穂市、宍粟市、佐用町、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、丹波篠山市、丹波市、洲本市、淡路市



### ■ 国内分布

本州、四国、九州、琉球諸島

### ■ 選定理由

人為性	特殊性	学術性
生育環境破壊	特殊生育環境	<input type="radio"/>
観賞用等採取	特異な生態	<input type="radio"/> 分布の限界 希少

### ■ 特記事項

—

### ■ 保護上の留意点

—



写真提供:松岡成久

### ■ 種の概要

湿地または乾いた水田等に生える無茎の一年草。葉は束生し、線形で長さ3-8cmになり、下部の幅1-2mm、3脈があり、格子状、先はのみ形になる。花は8-9月。花茎は高さ4-15cmで、肋はほとんどなく、ねじれない。鞘は長さ1-2.5cm。頭花は卵状球形で径4mm内外、灰白色または淡褐灰色。総苞片は膜質、長楕円形で先は鈍く、灰白色、無毛で花より短い。花床はほとんど無毛、または毛がまばらにある。