

フクロハイゴケ

Vesicularia ferriei (Card. & Ther.) Broth.

兵庫県ランク… C

環境省ランク… —

■ 県内分布


西宮市、佐用町、丹波市、洲本市

■ 国内分布

本州、四国、九州、琉球諸島

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊		特殊生育環境		特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	
				希少	○



■ 特記事項

—

■ 保護上の留意点

—

■ 種の概要

植物体は長さ10cm以上にもなり、水平にはって不規則な羽状に分枝する。葉は密にやや扁平につき、乾くと先が曲がり、枝は葉を含めて幅1.5-2mm、卵形から広卵形で非相称、広い鋭頭から鈍頭、基部の片側の葉縁はふつう内曲する。腹側に出る枝葉はふつう漸尖して鋭頭、ほぼ全縁。中肋は2叉して短い。葉身細胞は六角形からやや長い六角形で幅がひろく薄壁。翼細胞はほとんど分化しない。雌雄同株(異苞)。蒴柄は長さ1-1.5cm。蒴は広卵形で短い。乾くと葉がねじれて縮れるのが特徴。水辺のぬれた岩上や地上に生育する。