

(哺乳類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着	国の指定状況	本県での影響										分布 古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド								備考							
								生物多様性への影響				産業影響			人への影響				河川・水路(河川敷含む)	池沼・湖沼	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海岸・沿岸	草地	森林		市街地						
					Z Y 警戒種	定着 : 定着の怖れが高いもの	特定(特定外来生物) 要注意(要注意外来生物)	競争、捕食、駆逐など	在来生物への病原菌、寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路											
8	ネコ	イタチ	チョウセンイタチ	<i>Mustela sibirica</i>	Z																													ニホンイタチとの種判別を伴った県内での正確な分布調査はないが、西日本一帯に生息していると考えられている。
9	ネコ	ジャコウネコ	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>	Z																												神戸市、南但馬地域で生息情報がある。神戸市では実際に捕獲されている。	
10	ネコ	ネコ	ノネコ	<i>Felis catus</i>	Z																												捕食行為などによる生態系へのインパクトが大きい。	
11	ネズミ	リス	タイワンリス	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	Y		特定																										神奈川県、静岡県、岐阜県、大阪府、和歌山県、長崎県などで定着していると言われている。在来のリス類との競合などが懸念される。	
12	ネズミ	リス	プレーリードッグ類	<i>Cynomys sp.</i>	Y																												過去に情報が寄せられた時期があったが生息確認には至っていない。	
13	ネコ	イタチ	フェレット	<i>Mustela furo</i>	Y		要注意																										大量にペットとして利用されており、定着すれば捕食行為などにより在来生物相に影響を与える可能性がある。	

兵庫県における生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(鳥類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着	国指定 の状況	本県での影響											分布 :古い記録、 不確実な情報、 可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド	備考													
								生物多様性 への影響			産業影響				人への 影響																			
					Z Y 警戒種	定着	特定 (特定外来生物) 注意 (要注意外来生物)	競争、捕食、駆逐など	交雑による遺伝的攪乱	在来生物への病原菌、 寄生虫などの媒介	生態系基盤の 変化	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨西部	播磨東部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	
1	ハト	ハト	ドバト	<i>Columba livia</i>	Z																													山地を除く県内全域に生息し、特に人口集中地に多い。農業被害のほか建築被害(糞害)が大きい。
2	スズメ	チメドリ	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>	Z		特定																											飼い鳥として古くから輸入されている外来鳥類。県内では、1980年に裏六甲で繁殖が確認されたとともに、1995年以降は表六甲でも確認され、個体数が劇的に増えている。また、最近では六甲山系以外に、繁殖期である2004年7月に氷ノ山山頂近くで生息が確認された。影響の実態は不明であるが、標高の高い落葉広葉樹林のササ藪に営巣するため、類似環境に営巣するウグイスなど外来種への影響が危惧される。
3	カモ	カモ	アヒル	<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>	Y																												公園の池などに幅広く生息している。主に飼育下で生息するが、中には野生化し、池や河川のそばなど淡水域で生息している。マガモから人為的に作り出された家禽でマガモとの交雑の可能性がある。	
4	カモ	カモ	アイガモ	<i>Anas platyrhynchos</i> x <i>A. p.</i> var. <i>domestica</i>	Y																												野生のマガモとそれを家畜化したアヒルとの交雑種である。アイガモ農法で使用されたり、愛玩用として飼育されるが、逸出したアイガモがマガモと交雑する可能性がある。	
5	スズメ	ムクドリ	ハッカチョウ	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Y																												飼い鳥として県内に持ち込まれたものが逃げ出し、野生化したと考えられている。県内では、1982年に姫路市で初めて確認され、次第に加古川、明石と東にその生息範囲を広げ、神戸市、西宮市、伊丹市でも出現情報がある。また、スポット的に豊岡市でも確認されている。生息実態や影響の詳細は不明であるが、今後の動向に注意する必要がある。	
6	スズメ	カラス	カササギ	<i>Pica pica</i>	Y																												日本では佐賀平野とその周辺でのみ生息する。県内では、明石で繁殖していた時期がある。生息実態や影響の詳細は不明であるが、今後の動向に注意する必要がある。	

兵庫県に生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(爬虫類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着 状況	国指定 指定	本県での影響													分布 古い記録、 不確実な情報、 可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド							備考		
								生物多様性 への影響			産業影響				人への 影響							河川・水路 (河川敷含む)	池沼・湖沼	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地		森林	市街地
1	カメ	カミツキガメ	カミツキガメ	<i>Chelydra serpentina</i>	Z	定着	特定	生態系基盤の 変化	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	捕食性が強く、定着した場合、水域生態系の 上位を占める。繁殖力も比較的強く、一度高密度 になってしまうと分散も早く、完全除去が難 しくなる。
2	カメ	カミツキガメ	ワニガメ	<i>Macrolemys temmincki</i>	Z	定着	要注意	生態系基盤の 変化	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	性質等はカミツキガメと同様であるが、繁殖力 がはるかに弱く、繁殖集団としての定着の危 険性は低い。
3	カメ	ヌマガメ	アカミミガメ(ミシシッ ピアカミミガメ含む)	<i>Trachemys scripta elegans</i>	Z	定着	要注意	生態系基盤の 変化	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	雑食性で動物質から植物質まで幅広く利用す る点、繁殖力が旺盛で容易に高密度に達する 点などから、生態系への影響、特に生態的に 競合することが予想されるニホンイシガメへの 影響が懸念される。
4	カメ	スッポン	チュウゴクスッポン	<i>Pelodiscus sinensis sinensis</i>	Z	定着	要注意	生態系基盤の 変化	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	日本のスッポンは従来、すべて外来性とされて いたが、近年、集団遺伝学的、古生物学的研 究から在来固有亜種の存在が確認された。大 陸産基亜種の定着は在来亜種の遺伝的攪乱 につながると懸念される。
5	カメ	イシガメ	クサガメ	<i>Chinemys reevesii</i>	Y	定着		生態系基盤の 変化	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・沿岸 塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	長く在来種と考えられてきたが、現在、日本に 見られる集団がすべて外来である可能性が高 い。遺伝浸透や競合を通じた日本の固有種ニ ホンイシガメへの影響が懸念される。

兵庫県における生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(両生類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着 の状況	国指定 の指定	本県での影響										分布 古い記録、 不確実な情報、 可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド						備考	
								生物多様性 への影響			産業影響				人への 影響				河川・水路 池沼・湖沼 水田・畑地	干潟・塩性 湿地	海浜・沿岸 草地	森林	市街地			
Z	Y
1	有尾	オオサンショウウオ	チュウゴクオオサンショウウオ	<i>Andrias davidianus</i>	Z	中国産のオオサンショウウオで、食用として輸入されたものが、京都鴨川で野生化した。在来種への遺伝浸透の可能性も指摘されている。
2	無尾	アカガエル	ウシガエル	<i>Rana catesbeiana</i>	Z	...	特定	捕食性が高く、潜在的餌動物への影響が大きい。カエルツボカビやラナウイルスの保菌者としても要注意である。ただし定着してから長期を経ているため、すでに在来生態系の1要素となっていることに留意した対応が必要である。	

兵庫県生物多样性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(魚類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	国 指 定 状 況	本県での影響											分布 :古い記録、 不確実な情報、 可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド							備考							
							生物多様性 への影響			産業影響			人 への 影響						河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林		市街地						
					Z Y 警 戒 種	特 定 (要 注 意) (特 定 外 来 生 物 要 注 意 外 来 生 物)	競 合、捕 食、駆 逐 等	交 雑 による 遺 伝 的 攪 乱	在 来 生 物 への 病 原 菌、 寄 生 虫 などの 媒 介	生 態 系 基 盤 の 改 変	農 業 への 影 響	林 業 への 影 響	漁 業 への 影 響	利 水・治 水 障 害	景 観 への 影 響	人 への 健 康 被 害	人 への 直 接 被 害	神 戸・阪 神	播 磨 東 部	播 磨 西 部	但 馬	丹 波	淡 路	池 沼・湖 沼	河 川・水 路 (河 川 敷 含 む)	水 田・畑 地	湿 地	干 潟・塩 性 湿 地	海 浜・沿 岸	草 地	森 林	市 街 地	
1	スズキ	サンフィッシュ	ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus</i>	Z	特定																											捕食性が高く、在来魚類や水生昆虫などへの影響が大きい。繁殖力が旺盛で容易に高密度に達するため、一度侵入すると駆除が困難である。
2	スズキ	サンフィッシュ	オオクチバス	<i>Micropterus salmoides</i>	Z	特定																											捕食性が高く、在来魚類や水生昆虫などへの影響が大きい。繁殖力が旺盛で容易に高密度に達するため、一度侵入すると駆除が困難である。
3	コイ	コイ	ソウギョ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	Y	要注意																										現状は不明であるが、コイと同様に河床の小動物、水際を含む水棲植物を食い荒らす。現生息河川での繁殖はしないと思われるが、寿命が長く大型なので、1個体当たりの影響は大きいと考えられる。	
4	コイ	コイ	コイ	<i>Cyprinus carpio</i>	Y																												各地の水系に飼育品種を含め放流されている。小水系、あるいは大量に放流された場合、底生小動物や水草を食いつくす。大半の時間、河床に口を差し入れ、砂泥を動かすなど、河床の不安定化をもたらす。川の美化ということで、放流や保護活動が盛んであるが、在来魚の多い川での大量放流は避けたい。
5	コイ	コイ	タイリクバラタナゴ	<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>	Y	要注意																										場所によっては高密度に棲息するが、産卵基盤のドブガイ類の減少などで少なくなっている。在来のニッポンバラタナゴと容易に交雑するが、県内では放流と見られるニッポンバラタナゴが散在するものの、自生のもは、すでに絶滅しているため、その点での問題はない。ただし、他の在来種と減少する産卵基盤となるイシガイ類を競合することで、他種への影響が大と思われる。	

(魚類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着	国の状況	本県での影響													分布 :古い記録、 不確実な情報、 可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド	備考											
								生物多様性への影響			産業影響			人への影響			河川・水路(河川敷含む)			池沼・湖沼														
								競争、捕食、駆逐など	交雑による遺伝的攪乱	外来生物への病原菌、寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路(河川敷含む)	水田・畑地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地		
6	サケ	サケ	サケ	<i>Oncorhynchus keta</i>	Y																													在来群との交雑や疾病の持込が懸念される。
7	サケ	サケ	ヤマメ種群	<i>Oncorhynchus masou group</i>	Y																												県下の日本海・瀬戸内海流入河川では、本種群は2亜種に分かれていたが、日本海側へ養殖しやすい亜種のアマゴが著しく放流されてきた。岸田川ではヤマメの棲む支流を禁漁区として管理しているが、放流個体はアマゴであることから、回遊性群との交雑は免れない。	
8	カダヤシ	カダヤシ	カダヤシ	<i>Gambusia affinis</i>	Y		特定																										メダカと生息環境が重複し、特に市街地環境下に多い。カダヤシが多い場所では、環境の悪化も加えメダカはほとんどいない。	
9	スズキ	スズキ	タイリクスズキ	<i>Lateolabrax sp.</i>	Y		要注意																										一時期、種苗が放流されたり、あるいは逸出したと思われるものが、瀬戸内海で漁獲、釣獲され、河口でも採集されている。在来種のスズキとの交雑や置換が心配される。	
10	スズキ	サンフィッシュ	コクチバス	<i>Micropterus dolomieu</i>	Y		特定																										生息情報はありますが被害情報が今のところない種である。一般にはオオクチバスよりも低水温を好み、流れの速い河川でも生息できるという性質から、オオクチバスが侵入できないような渓流域や流水域にも侵入し、在来生物へ影響を与えることが危惧されているので、現状でしっかりと拡大抑制する必要がある	

兵庫県に生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(昆虫類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着	国の指定状況	本県での影響										分布 :古い記録、不確実な情報、可能性高いもの					影響を及ぼすフィールド	備考							
								生物多様性への影響		産業影響				人への影響				河川・水路(河川敷含む)	池沼・湖沼	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地			海浜・沿岸	草地	森林	市街地			
Z	Y	注意種	警戒種	特定外来生物	注意外来生物	要注外来生物	競争、捕食、駆逐など	在来生物への病原菌、寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神						播磨東部	播磨西部					但馬	丹波	淡路
1	ハチ	ハナバチ	セイヨウオオマルハナバチ	<i>Bombus terrestris</i>	Z		特定																								温室から逸出した個体が野生化している。在来マルハナバチ類を競合により駆逐するおそれがあり、植物の繁殖にも悪影響を及ぼす可能性がある。逃亡防止のネット対策などを厳格に行う必要がある。
2	ハチ	アリ	アルゼンチンアリ	<i>Linepithema humile</i>	Z		特定																							県内では1999年に神戸港で発見され、神戸港では少なくとも4回の侵入があったとされる。スーパーコロニーを形成し、競合により在来アリ相の多様性を低下させたり、アブラムシ、カイガラムシを保護するため農作物に被害を与えるなど生態系への影響は甚大である。家屋内に侵入することで不快害虫、衛生害虫ともなる。防除は困難で、侵入初期に集中的な防除が必要である。	
3	カメムシ	アメンボ	トガリアメンボ	<i>Rhagadotarsus kraepelini</i> Breddin	Y																									2001年に淡路島北都と神戸市で発見された後、急速に分布を広げている。ため池などの止水に生息し、在来生物への影響は现阶段では不明であるが注意が必要である。	
4	コウチュウ	クワガタムシ	クワガタムシ科	<i>Lucanidae</i> spp.	Y		要注意																							外国産クワガタムシの大量輸入にともない、逸出や放逐に由来する成虫が野外で発見されており、定着が現実化していると思われる。在来種との交雑や競合が懸念され、今後大きな影響を及ぼす可能性がある。	
5	コウチュウ	ゾウムシ	アルファルファタコゾウムシ	<i>Hypera postica</i>	Y																									比較的最近(1980年代)に兵庫県に侵入・定着した害虫で、マメ科植物を食害し、ミツバチの蜜源植物であるレンゲへの被害が大きい。また、食害以外にも人間生活に影響を及ぼすとも言われており、今後の動向を注意する必要がある。	

兵庫県 of 生物多样性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(クモ類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着	国指定状況	本県での影響											分布 :古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド							備考					
								生物多样性への影響			産業影響				人への影響					河川・水路(河川敷含む)	水田・畑地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地						
					Z・Y・・・・警戒種	定着	特定(外来生物)	競争、捕食、駆逐など	交雑による遺伝的攪乱	在来生物への病原菌、寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	水田・畑地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	
1	クモ	ヒメグモ	セアカゴケグモ	<i>Latrodectus hasseltii</i>	Z		特定																									側溝内部、フェンス基部、自動販売機の裏など、穴や隙間に網を張って生息する。コンテナや建築資材の運搬などにも分布が拡大し、個体数の増加とともに咬傷被害も増加する傾向にある。強い神経毒をもち、咬まれると痛みや熱感などの症状が生じ、重症化することもある。特に幼児や高齢者では注意が必要である。踏みつぶしやピレスロイド系殺虫剤で駆除できるが、卵のうは除去しなければならない。
2	クモ	ウシオグモ	クロガケジグモ	<i>Badumna insignis</i>	Y																											1969年代に大阪府で発見され、分布を広げている。建造物の周辺にボロ網を張って生息する。在来生物への影響は不明である。わが国では被害はないが、原産地では皮膚壊死を起こす咬傷例もある。
3	クモ	ヒメグモ	ハイイロゴケグモ	<i>Latrodectus geometricus</i>	Y		特定																									強い神経毒をもち、咬まれると激しい症状をとまなう可能性がある。貿易港で物資とともに侵入する可能性がある。

兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(貝類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着 の状況 国指定 要注 意 定着 の怖れ が高い もの	本県での影響										分布 :古い記録、 不確実な情報、 可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド							備考															
							生物多様性 への影響			産業影響				人への 影響				河川・水路 池沼・湖沼 水田・畑地 湿地 干潟・沿岸 海浜・沿岸 草地 森林 市街地																						
					Z Y 警戒種		特定(特定外来生物) 注意(要注外来生物)	競合、捕食、駆逐など	交雑による遺伝的攪乱	在来生物への病原菌、 寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害		人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路															
1	ニナ	リンゴガイ	スクミリンゴガイ	<i>Pmacea canaliculata</i>	Z		要注 意																															水稲苗の食害、卵による護岸壁の汚損などの被害がある。		
2	イガイ	イガイ	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Z		要注 意																														年による発生ムラがあるが、養殖カキに付着し、成長阻害や作業困難を生じさせている。垂下漁具などに著しい量の付着が見られるが、近年はミドリイガイのほうが顕著である。ただし、数年にわたって生育するので、個体サイズの被覆は大きい。近年はミドリイガイの繁殖や被害が目立ち、本種の生息量は以前ほどでなくなっているが、楽観視できない。			
3	イガイ	イガイ	ミドリイガイ	<i>Perna viridis</i>	Z		要注 意																														年による発生ムラがあるが、2001年以降、養殖カキに著しく付着し、成長阻害や作業困難を生じさせている。発電所や工場の取水管内に著しい量の付着が見られる。県内では越年個体は未確認である。			
4	ハマグリ	シジミ	タイワンシジミ種群	<i>Corbicula fluminea</i>	Z		要注 意																														在来のマシジミとは本来、同一の種類と考えられるので、区別が難しい。3倍体であり交配による真の遺伝子汚染はないが、タイワンシジミの精子がマシジミにかかれば、タイワンシジミとなる。水道設備で大量発生することがある。これまで、シジミの生息が無かった場所で急激に大量に発生することから、水質がよくなったなどの誤解を招くこともしばしばある。			
5	ニナ	カリバガサガイ	シマメノウフネガイ	<i>Crepidula onyx</i>	Y																																岩礁内湾域では転石、巻貝類にかなりの量が被覆している。アカニシやサザエ、ミガキボラなどに付着し奇形などの成長障害を起こしている。			

(貝類)

No	目名	科名	和名	学名	ランク	定着	国の指定状況	本県での影響										分布 ：古い記録、不確実な情報、可能性高いもの										影響を及ぼすフィールド	備考								
								生物多様性への影響					産業影響					人への影響					河川・水路 池沼・湖沼	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸			草地	森林	市街地					
					Z Y 警戒種 注意種	要 注意 (特定外来生物) (要注意外来生物)	特定 (特定外来生物) 競合、捕食、駆逐など	交雑による遺伝的攪乱	在来生物への病原菌、 寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路													
6	ニナ	ミズツボ	コモチカワツボ	<i>Pomatopyrgus antipodarum</i>	Y																																草食性水棲昆虫との競合や水棲昆虫食の魚類の誤食による栄養障害が懸念される。ホタルの繁殖力低下も懸念されている。
7	マイマイ	コウラナメクジ	チャコウラナメクジ 近似種	<i>Lehmannia</i> sp.	Y																															畑や園芸作物の新芽を食害したり白菜などの中に入り込むなどの被害を与えるが、軽度である。ただ、個人園芸などには大きな打撃を与えることがある。	
8	マイマイ	コウラナメクジ	チャコウラナメクジ	<i>Lehmannia valentiana</i>	Y																															畑や園芸作物の新芽を食害したり白菜などの中に入り込むなどの被害を与えるが、軽度である。ただ、個人園芸などには大きな打撃を与えることがある。また、屋内にも入り込み不快感を与えることもある。	
9	イガイ	イガイ	カワヒバリガイ	<i>Limnoperna fortunei</i>	Y																															現状では2河川での自然繁殖が確認されているのみだが、今後、大量繁殖しやすいダム湖などに入らないように早急な駆除が必要である。取水設備の汚損も懸念されている。	
10	イガイ	イガイ	コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>	Y																															護岸の隙間や転石下面を被覆し、同じニッチをもつ生物と競合が懸念されている。垂下漁具などの汚損生物でもある。	

兵庫県 of 生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

(維管束植物) - 対策を優先して行うことを推奨するもの

No	科名	和名	学名	ランク	定着	国指定状況	本県での影響												分布 :古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド						備考						
							生物多様性への影響			産業影響			人への影響			池沼・湖沼	河川・水路(河川敷含む)	水田・畑地		湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地							
Z	Y	注意種	競争、捕食、駆逐など	交雑による遺伝的攪乱	在来生物への病原菌、寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部				播磨西部							但馬	丹波	淡路	河川・水路(河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地
1	アカウキクサ	アゾラ・クリスタータ (アメリカオオアカウキクサ)	<i>Azolla cristata</i>	Z		特定																										絶滅危惧種に指定されている在来種のアカウキクサとオオアカウキクサに対する競争・駆逐の影響が危惧される。人為交雑では属内で雑種を形成することが確認されており、絶滅危惧種の遺伝的攪乱が危惧されている。
2	ウリ	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Z		特定																									河川敷や放棄畑、荒地で大群落を形成し、在来植生に大きな影響を与える。	
3	ヒユ	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> Griseb.	Z		特定																									池沼、河川で群落を形成し、在来植生と競合したり、水流を阻害して在来の水生生物の生活を阻害するとされる。	
4	マメ	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Z		要注意																									県内の多数の河川の河川敷で優占群落を形成している。また、森林に侵入して在来群落の成立を阻害する。	
5	セリ	ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Z		特定																									水面に浮遊して密なマット状に群生するので、光などが奪われて在来の水草類が駆逐されるとともに、水中の溶存酸素の減少により水生生物の生息環境が奪われるおそれが指摘されている。貧栄養の水系でも生育できるので、希少種の生育を脅かす可能性も高いとされている。	
6	アリトウグサ	オオフサモ	<i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess.	Z		特定																									大繁茂する傾向があり、水流を妨げたり、在来種への影響が大きい。	
7	ゴマノハグサ	オオカワヂシャ	<i>Veronica angallis-aquatica</i> L.	Z		特定																									準絶滅危惧種に指定されている近縁の在来種カワヂシャと交雑して雑種ホナガカワヂシャを形成し、その雑種は発芽能力のある種子を生産することが、野外観察及び人為交配実験から確認されており、在来種の遺伝的攪乱が生じている。重要湿地への侵入の危険が大きい。	

(維管束植物) - 緑化利用により影響の拡大が懸念されるもの

No	科名	和名	学名	ランク	定着	国の指定状況	本県での影響										分布 :古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド	備考														
							生物多様性への影響			産業影響				人への影響																			
				Z Y 警戒種	定着	特定外来生物 要注意(要注意外来生物)	競争、捕食、駆逐など	在来生物との媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路(河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地		
16	タデ	イタドリ (県外産・国外産)	<i>Reynoutria japonica</i>	Z																													法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。
17	マメ	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Z		要注意																										河川敷などに侵入・定着し群落を形成し、在来植生に影響を与えている。自然性の高い地域への侵入事例も知られていることから、そうした地域での法面緑化には注意が必要である。河川堤防法面、道路法面に導入されたものが分布拡大している。	
18	マメ	コマツナギ (県外産・国外産)	<i>Indigofera</i> sp.	Z																												法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。	
19	マメ	マルバハギ (県外産・国外産)	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i>	Z																												法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。	
20	マメ	カラメドハギ (県外産・国外産)	<i>Lespedeza juncea</i> Pers.	Z																												法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。	
21	モクセイ	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	Z		要注意																										移植が容易で生長が速く、大気汚染に強いことなどから、街路樹や公園樹等として広く利用されている。河川敷に優占群落を形成したり、森林で定着し、低木層を優占することもあり、種子供給源が県下に多数あるため、注意が必要。道路法面等にも侵入している。	
22	カバノキ	ヤマハンノキ (県外産・国外産)	<i>Alnus hirsuta</i>	Z																												法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。	
23	カバノキ	ヒメヤシャブシ (県外産・国外産)	<i>Alnus pendula</i>	Z																												法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。	

(維管束植物) - 緑化利用により影響の拡大が懸念されるもの

No	科名	和名	学名	ランク	定着 ：定着の怖れが高いもの	国の指定 ：特定外来生物 ：要注意外来生物	本県での影響										分布 ：古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド					備考				
							生物多様性への影響		産業影響			人への影響						池沼・湖沼	河川・水路 (河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地		海浜・沿岸	草地	森林	市街地
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I						H				
24	カバノキ	オオバヤシャブシ (県外産・国外産)	<i>Alnus sieboldiana</i>	Z																							法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。
25	トウダイグサ	ナンキンハゼ	<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.	Z																							植栽木より逸出し、河川敷や林内に定着しており、優占群落を形成する可能性が高い。
26	フジウツギ	フサフジウツギ(ニシキフジウツギ)	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Z																							山地の崩壊地や道路法面で優占群落を形成し、分布拡大している。
27	キク	ヨモギ (県外産・国外産)	<i>Artemisia princeps</i>	Z																							法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。
28	キク	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>laciniata</i>	Z		特定																					寒さや湿地に強く、盛んに繁殖する性質を持つ種である。貴重な湿原植物で在来の重要種の減少を引き起こしている事例が知られている。また、いったん侵入すると毎年刈り取っても、根絶は不可能とされているため、要注意である。
29	イネ	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Z		要注意																					耐陰性などの様々な環境耐性を持つため、牧草や緑化植物として全国で広く用いられているが、自然性の高い環境や希少種の生育環境に侵入し、問題になっている。道路法面・河川堤防法面などで優占群落化している。
30	イネ	チガヤ (県外産・国外産)	<i>Imperata cylindrica</i>	Z																							法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。
31	イネ	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Z																							河川敷および堤防・道路・法面で優占群落化する。花粉症の原因にもなっている。県下の多数の河川で定着している。
32	イネ	ススキ (県外産・国外産)	<i>Miscanthus sinensis</i>	Z																							法面緑化に使用される外国産(兵庫県外産)の在来種で、本来自生している在来種との競合や遺伝的攪乱が危惧される。

(維管束植物) - 緑化利用により影響の拡大が懸念されるもの

No	科名	和名	学名	ランク	定着	国指定状況	本県での影響											分布 :古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド	備考														
							生物多様性への影響			産業影響				人への影響																				
				Z Y 警戒種 注意種 警戒種	特定外来生物 要注意(要注意外来生物)	競合、捕食、駆逐など	在来生物への病原菌、 寄生虫などの媒介	生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	池沼・湖沼	河川・水路(河川敷含む)	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地		
33	スイレン	セイヨウスイレン(スイレン園芸品種含む)	<i>Nymphaea hybrida</i> Hort.	Y																														公園や人家に近いため池などに広く分布している。水面を覆い尽くし、在来の水生植物を駆逐するおそれがある。
34	メギ	ヒラギナンテン	<i>Mahonia japonica</i>	Y																														森林内に侵入し、在来の下層植生に影響を与える可能性がある。
35	アオイ	ケナフ	<i>Hibiscus cannabinus</i> L.	Y																														成長が速く、収穫できる繊維も多いため、木材パルプの代替資源として注目を浴びるようになった。強い繁殖力を持つことなどの点で、セイタカアワダチソウなどのように一度野外に定着すると駆除が困難になるおそれもある。人為的な播き出しは防止すべきである。
36	バラ	ピラカンサ類(タチバナモドキ、トキワサンザシ、カザンデマリなど)	<i>Pyracantha</i> spp.	Y																														河川敷で林縁部に定着し、一部県外地域で優占群落を形成することが知られている。植栽が多く逸出の頻度が高いため注意を要する。
37	マメ	ハリエニシダ	<i>Ulex europaeus</i> L.	Y			要注意																											侵入すれば、河川堤防や道路法面で優占群落化のおそれがある。
38	ニガキ	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Y																														市街地の路傍、中央分離帯に多数侵入している。河川敷で優占群落を形成し、森林林縁部にも侵入している。ルートサッカー(根から「ひこばえ」が発生する)のため面積拡大しやすい性質をもつため、要注意。
39	モクセイ	セイヨウイボタ(ヨウシュイボタ)	<i>Ligustrum vulgare</i>	Y																														夏緑林下や道路法面で定着している。隣接する植栽地からの逸出もみられ要注意である。
40	クルマ	シナサワグルミ	<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.	Y																														河川の流水縁に定着し、列状に分布する。
41	クマツツラ	ヒメイワダレ	<i>Phyla incisa</i> Small	Y																														栄養繁殖が旺盛で、優占群落化が懸念される。今後の影響が危ぶまれる。

(維管束植物) - 影響は甚大であるが、駆除が困難なことから、やむを得ず対策の優先順位を低く設定したもの(県内の現状及び全国的傾向から判断しYランクとしたもの)

No	科名	和名	学名	ランク	定着	国の指定状況	本県での影響													分布 :古い記録、不確実な情報、可能性高いもの	影響を及ぼすフィールド						備考				
							生物多様性への影響	産業影響			人への影響		河川・水路(河川敷含む)	池沼・湖沼	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地		森林	市街地									
42	セリ	ウチワゼニグサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A.Rich.) Fernald	Y			生態系基盤の改変	農業への影響	林業への影響	漁業への影響	利水・治水障害	景観への影響	人への健康被害	人への直接被害	神戸・阪神	播磨東部	播磨西部	但馬	丹波	淡路	河川・水路(河川敷含む)	池沼・湖沼	水田・畑地	湿地	干潟・塩性湿地	海浜・沿岸	草地	森林	市街地	特定外来生物に指定されているブラジルチドメグサと同属の種で、水草として人気が高く、逸出の危険性が高い。野生化した場所では旺盛に繁茂し、在来の水生植物に深刻な影響を与えるおそれがある。	
43	アカバナ	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i>	Y		要注意																									砂浜や河川敷に侵入するため、そうした環境に特異的な在来植物への競合・駆逐のおそれがある。
44	クマツヅラ	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	Y																										河川敷で優占する。	
45	キク	クワイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Y		要注意																								既に広く野生化しており、河川では、河川敷固有の在来種等と競合・駆逐のおそれがある。河川敷や放棄畑などで優占群落を形成している。	
46	アヤメ	キショウブ	<i>Iris pseudoacorus</i> L.	Y		要注意																								繁殖力が強く、海外では水路等の雑草になっており、日本でも水辺の在来種と競合・駆逐のおそれがある。近縁種に絶滅危惧種が含まれ、それらの遺伝的攪乱のおそれがある。また、美しい花が親しまれ、観賞用に栽培されることが多いため、分布を拡大するおそれが大きい。	
47	イネ	スズメノナギナタ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	Y																										淡路島の成ヶ島に定着している。競合する植物がない空いたニッチで優占群落を形成しており、在来の海浜植物の生育立地を奪う可能性がある。	

