

シロネハナヤスリタケ

Elaphocordyceps ×jezoensis (Kobayasi) Hirok. Sato, S. Ban,
Masuya & Hosoya

兵庫県ランク… B

環境省ランク… —

■ 県内分布


神戸市、猪名川町

■ 国内分布

山形県、福島県、京都府、兵庫県、他

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊	○	特殊生育環境		特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	○
				希少	○



■ 特記事項

日本特産の菌で、分布は北海道から近畿とひろいが、発生は非常にまれ。本県の発生地は荒れた里山で、落ち葉の堆積が著しく、地表付近の環境悪化による宿主のツチダンゴの死滅に伴い消滅する可能性が高い。

■ 保護上の留意点

発生地の保全。

■ 種の概要

ツチダンゴに発生する。地生型。子実体はこん棒型。単一か2個を生じ、地上部の高さ2.5-6cm。結実部は上端に生じ、円筒形か狭楕円形、高さ1.5-2.8cm、径3-10mm。はじめ橙黄色、のちセピア色から淡灰黒色となる。ミズナラ、コナラ、ブナ、ヤマハンノキ、ヤマウルシ、ときにアカマツ林内に発生。発生期は9-10月。まれ。