

キシメジ科

# ハエトリシメジ

*Tricholoma muscarium* Kawam. ex Hongo

兵庫県ランク… 注  
環境省ランク… -

## ■ 県内分布


神戸市、姫路市、宍粟市、上郡町、豊岡市、養父市

## ■ 国内分布

埼玉県、兵庫県、他

## ■ 選定理由

| 人為性    | 特殊性    | 学術性   |
|--------|--------|-------|
| 生育環境破壊 | 特殊生育環境 | 特殊な分布 |
| 観賞用等採取 | 特異な生態  | 分布の限界 |
|        |        | 希少    |
|        |        | ○     |



## ■ 特記事項

コナラ林やアカマツ・コナラ林等の混成林に発生し、県内での観察はまれ。分布は日本のみ。

## ■ 保護上の留意点

発生地の保全。

## ■ 種の概要

傘は径4-6cm、初め円錐形、のちほぼ平らに開くが、中央はつねに突出する。表面は粘性なく、地色は淡黄色であるが帯褐オリーブ色の繊維紋で密に被われ、中央部は濃色、周辺は淡色、あるいは全面が一様に帯褐オリーブ色を呈することもある。肉はほとんど白色。秋(9-10月)にコナラ・クヌギ等の広葉樹林内の地上に群生、または点々と発生。