

ヒメノガステル科

ナガエノスギタケ

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken

兵庫県ランク… 注
環境省ランク… —

■ 県内分布


神戸市、加東市、姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、養父市

■ 国内分布

兵庫県、他

■ 選定理由

人為性	特殊性	学術性
生育環境破壊	特殊生育環境	特殊な分布
観賞用等採取	特異な生態	○ 分布の限界
		希少 ○



■ 特記事項

県内多くの地点で観察されるが、安定的ではない。樹木とモグラ類と菌類のバランスがとれた豊かな自然が保たれていることを示す。

■ 保護上の留意点

発生地 の保全、発生場所から谷川や沢へ の間にコンクリート、石垣など構造物や道路を計画する場合、配慮が必要。



写真提供：浅見哲也

■ 種の概要

傘は径8-15cm、饅頭形からやや中高の平らに開き、表面は黄土褐色で周辺は淡色または全体がほとんど白色、帯褐色の鱗片を散布するかまたは平滑で湿っているとき粘性をあらわす。肉は堅くしまり、白色、香料のきつい石鹼のようなおいがある。秋に広葉樹林内に生えるが、モグラ類の巣付近の排泄所あとから発生することが知られている。