

95 ケハダピロウドマイマイ (ナンバンマイマイ科)

兵庫県ランク:B

Nipponochloritis fragilis

環境省ランク:NT

種の概要

東北南部以西の本州、四国に分布する。殻長約16mm、殻径約22mm。螺塔は低いドーム状、殻表は毛状の付属物により規則的に覆われている。毛の密度はほかのピロウドマイマイ類より粗いが、毛の密度は地域変異がある。殻底部の臍孔は開いている。

主要な選定理由

人為性			生息環境の特殊性		学術性		
個体数激減	分布域に影響	営利目的捕獲	特殊生息環境	地域的孤立	分布が極限	分布の限界	希少
			△				○

県内分布

神戸市、西宮市、宝塚市、川西市、猪名川町、三木市、小野市、加西市、相生市、たつの市、宍粟市、豊岡市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市


県内における生息状況及びその他特記事項

新規追加種。既知生息地は多く存在するが、生息密度は低い。また高い湿度が年間を通して保たれるような特殊な環境(例えば多くの朽木が集積したところ)にのみ生息しているため、少しの外圧によって生息地が消滅する可能性が大きい。

保護上の留意点

自然林、里山の雑木林の保護、管理が必要である。

写真提供：増田修



【執筆者】 大原健司