（R5.6.1変更）
（甲殻類）ー対策を優先して行うことを推奨するもの

| No | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | ランク | 定着 | 国指定の状況 | 本県での影響 | | | | | | | | | 分布<br>△：古い記録、不確実な情報、可能性高いもの | | | | | | 影響を及ぼすフィールド | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 生物多様性への影響 | | | | 産業影響 | | | | | 人への影響 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Z：警戒種<br>Y：注意種<br>・・・ | ○：定着<br>△：定着の怖れが高いもの | 特定（特定外来生物）<br>被害（生態系被害防止外来種） | 競合、捕食、駆逐など | 交雑による遺伝的撹乱 | 在来生物への病原菌、寄生虫などの媒介 | 生態系基盤の改変 | 農業への影響 | 林業への影響 | 漁業への影響 | 利水・治水障害 | 景観への影響 | 人への健康被害 | 人への直接被害 | 神戸・阪神 | 播磨東部 | 播磨西部 | 但馬 | 丹波 | 淡路 | 池沼・湖沼 | 河川・水路（河川敷含む） | 水田・畑地 | 湿地 | 干潟・塩性湿地 | 海浜・沿岸 | 草地 | 森林 | 市街地 | |
| R5-2 | 十脚 | アメリカザリガニ | アメリカザリガニ | *Procambarus clarkii* | Y | ○ | 特定※ | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 生息数は水路の改修や水田の乾田化などでかなり減少しているが、多産地域も未だある。水生植物の摂食というインパクトはかなりのものであることが指摘されている。<br><br>※R5.6.1より、条件付特定外来生物に指定 |