

158 クロジ

(スズメ目)

Emberiza variabilis

兵庫県ランク: A

繁殖個体群:A 越冬個体群:C 通過個体群:C

環境省ランク:

種の概要

カムチャツカ南部、千島列島、サハリン中・南部、日本北部などで繁殖し、繁殖後は日本南部、中国東部、朝鮮半島、ウスリーなどに渡り、越冬する。日本では主に北海道から本州で繁殖するが、四国でも繁殖するところがある。夏期はササなど林床植物の繁った落葉広葉樹林や針広混交林に生息する。冬には低山や山麓、丘陵の薄暗い森や社寺林に生息する。林床の昆虫類や草木の実などを採食する。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甕島列島、宇治群島、草垣群島、種子島、屋久島、伊豆諸島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島



写真提供：北野光良

(性別：オス)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、明石市、★西宮市、洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★豊岡市、★加古川市、★西脇市、★宝塚市、★川西市、★三田市、★加西市、★丹波篠山市、★養父市、★丹波市、南あわじ市、★淡路市、★宍粟市、加東市、たつの市、★猪名川町、★多可町、★稲美町、★神河町、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ね特殊 ぐ特殊 ら休息 環境・	局地的 繁殖	希少
	○				○	○		○	○



写真提供：北野光良

(性別：メス)

県内における生息状況およびその他特記事項

BランクからAランクへ変更。

県内では主に10-翌7月に生息するが、一部の山地では繁殖している。氷ノ山と扇ノ山の山頂付近では、営巣記録は少ないものの、繁殖期を通して生息が確認されている。多くは秋冬期に、平地で観察される。近年、シカの食害により営巣場所が激減しており、営巣地の厳重な保全対策が必要なため、Aランクへ変更した。

保護上の留意点

県内の繁殖地は国内でも重要な位置にあるが、高山の急峻な一帯で人為的な影響は考え難い。しかし、本種が越冬期に利用する山地から低地の環境は常緑広葉樹林を中心とした鬱蒼とした森林であり、そのような環境であれば都市緑地にも生息するため、平地にも森林を残すことが重要。