

145 ノビタキ

(スズメ目)

兵庫県ランク: A

Saxicola stejnegeri

繁殖個体群:Ex 越冬個体群:無 通過個体群:注

環境省ランク:

種の概要

シベリア東部から朝鮮半島、サハリン、千島列島、日本などで繁殖し、繁殖後は中国南部からアジア南部に渡る。日本では北海道、本州北・中部で繁殖する。春秋の渡りの時期には本州南西部、四国、九州、沖縄を通過する。背の低い草原に生息し、灌木や草の根元で営巣する。主に昆虫類を食べる。渡りの時期には平地の水田や川原に生息し、灌木の枝先や杭、草の葉先などに止まることが多い。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州北・中部、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、本州南西部、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甌島列島、宇治群島、草垣群島、種子島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島



写真提供：梅津節雄

(性別：メス(左)、オス(右))

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★芦屋市、★伊丹市、相生市、★豊岡市、★加古川市、赤穂市、西脇市、★宝塚市、三木市、高砂市、★川西市、小野市、★三田市、加西市、丹波篠山市、★養父市、丹波市、★南あわじ市、★朝来市、★淡路市、宍粟市、加東市、★たつの市、★稲美町、★神河町、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性				生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性		
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ ぐら 休息 環境・	局 地的 繁殖	希 少
○	○				○			○	○

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に4-5月と9-11月に生息する。1978年6月と1980年7月などに鉢伏高原で育雛中の巣が確認されているが、その後は繁殖が確認されていないため、繁殖個体群はExランクとした。

保護上の留意点

繁殖地である鉢伏高原の植生の維持および繁殖期間中の人の立ち入りの抑制などの対策が重要。また、渡り時期の生息地となるヨシ原や草丈の高い草原の保全、河川敷や領地の下草の刈り込みの抑制も重要。