

88 ミサゴ

(タカ目)

兵庫県ランク: B

Pandion haliaetus

繁殖個体群:B 越冬個体群:C 通過個体群:C

環境省ランク: NT

種の概要

北ヨーロッパからシベリア、中国東部、日本(九州以北)、フィリピン、オーストラリア、北アメリカなどに繁殖分布する。北方のものは繁殖後は温帯から熱帯域に渡る。海岸、大河川、湖沼などに生息し、断崖のある海岸や森林の大木などで繁殖する。主に魚類を、水面に急降下して捕食する。一時期、魚類の農薬汚染などで繁殖成功率が大きく低下したと考えられているが、最近はやや回復している。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、天売島、本州、飛島、佐渡、舢倉島、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甕島列島、宇治群島、草垣群島、上三島諸島、種子島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、北硫黄島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、尖閣諸島、大東諸島

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★西脇市、★宝塚市、★三木市、★高砂市、川西市、★小野市、★三田市、加西市、★丹波篠山市、養父市、丹波市、★南あわじ市、朝来市、★淡路市、★宍粟市、★加東市、★たつの市、猪名川町、多可町、★稲美町、福崎町、★神河町、太子町、★佐用町、★香美町、★新温泉町、播磨町



写真提供：三谷康則

(性別：不明)

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個 体 数 激 減	分 布 域 激 減	餌 の 可 用 性 の 低 下	特 殊 競 争 圧	特 殊 捕 食 圧	特 殊 繁 殖 環 境	特 殊 採 餌 環 境	ね特 ぐ殊 ら休 環息 境・	局 地 的 繁 殖	希 少
					○	○	○	○	

県内における生息状況およびその他特記事項

AランクからBランクへ変更。
かつては県内各地に周年生息し繁殖していたが、開発に伴い営巣地の多くが消滅し、個体数が激減した。近年は水辺の崖地や森林の樹上だけではなく、高圧鉄塔の上部で繁殖する個体も出現するようになった。最近は個体数がやや回復しているため、Bランクに変更した。

保護上の留意点

新規の営巣場所となっている高圧鉄塔上など、人工構造物での営巣環境の保全および繁殖期における営巣地周辺での釣りなどの規制が重要。