

139 コルリ

(スズメ目)

兵庫県ランク: A

Larivora cyane

繁殖個体群:A 越冬個体群:無 通過個体群:C

環境省ランク:

種の概要

シベリア南東部、中国北東部、朝鮮半島、サハリン、日本などで繁殖し、繁殖後は東南アジアなどに渡る。日本には春に渡来し、本州中部以北で繁殖するが、南西部以南でも繁殖するところがある。高い山地の針広混交林や落葉広葉樹林に生息し、崖地や地上に営巣する。低木や下枝がよく繁った林を好み、昆虫類、クモ類、ミズ類などの小動物を食べる。渡りの時期には山麓の雑木林などにも生息する。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、四国、九州、対馬、五島列島、男女群島、宇治群島、草垣群島、上三島諸島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島



写真提供：友田達也

(性別：オス)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、姫路市、★明石市、★西宮市、★芦屋市、★伊丹市、★豊岡市、★加古川市、★宝塚市、高砂市、三田市、★養父市、★丹波市、★南あわじ市、朝来市、★淡路市、★宍粟市、たつの市、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ 特殊 ら休 息環 境・	局 地的 繁 殖	希 少
○	○	○			○	○	○	○	○

県内における生息状況およびその他特記事項

BランクからAランクへ変更。

県内では主に4-9月に記録があるが、多くは県の北部と南部で春秋の渡りの時期に記録される。氷ノ山や扇ノ山周辺には少数が生息し繁殖している。近年、シカの食害により営巣場所が激減しており、営巣地の厳重な保全対策が必要なため、Aランクへ変更した。

保護上の留意点

繁殖期に生息している場所は極めて限定されるので、その場所の森林植生を現状のまま広く保存すること、また、渡りの時期に利用する低山や山麓の広葉樹林の保全育成が重要。