

第7-34表 海域底質測定結果 1 (平成20年度)

(平成20年8月)

水域名	地点名	泥質	色 相	臭 気	泥温 (℃)	含水率 (%)	強熱減量 (%)	硫化物 (mg/g)	C O D (mg/g)	P C B (μ g/g-Dry)
大 阪 湾 (1)	神戸市東部沖 1	シルト	緑灰色	硫化水素臭	22.8	57.1	10.7	0.7	26.2	0.04
	西宮市沖 1	シルト	黒灰色	硫化水素臭	22.0	54.3	9.7	0.5	20.2	0.040
大 阪 湾 (2)	神戸市東部沖 2	粘土混じりシルト	緑灰色	微硫化水素臭	24.0	53.9	10.1	0.5	24.8	0.039
	西宮市沖 2	シルト	黒緑色	硫化水素臭	23.8	58.6	11.5	0.5	31.0	0.039
大 阪 湾 (3)	神戸市東部沖 3	シルト混じり粘土	灰緑色	微硫化水素臭	23.8	50.6	9.7	0.3	24.5	0.022
大 阪 湾 (4)	神戸市中央部沖	粘土混じりシルト	緑灰色	微硫化水素臭	24.5	43.5	8.2	0.1	17.3	0.046
	神戸市東部沖 4	シルト混じり粘土	灰緑色	硫化水素臭	24.0	50.6	9.4	0.6	21.8	0.030
大 阪 湾 (5)	神戸市西部沖 1	砂質	茶色	なし	26.8	17.5	2.5	<0.1	1.2	<0.001
	神戸市西部沖 2	砂質	茶色	なし	26.5	19.3	3.1	<0.1	1.2	<0.001
洲 本 港 (1)	洲本内港内	シルト混じり砂	灰緑色	微硫化水素臭	26.5	19.0	1.6	<0.1	2.4	0.002
洲 本 港 (2)	洲本外港内	シルト混じり砂	灰緑色	なし	25.6	22.3	2.7	<0.1	5.6	0.013
津 名 港	津名港内	砂混じりシルト	緑灰色	微硫化水素臭	26.5	22.8	2.8	<0.1	6.1	0.004
播 磨 海 域 (1)	明石港内	シルト混じり砂	緑灰色	なし	26.5	22.2	2.5	<0.1	4.7	0.015
播 磨 海 域 (2)	別府港内	砂混じりシルト	緑灰色	微硫化水素臭	24.2	50.5	9.1	0.3	19.6	0.021
播 磨 海 域 (3)	高砂本港内	砂混じりシルト	黒緑色	なし	27.0	47.2	9.4	0.7	31.7	0.110
播 磨 海 域 (4)	高砂西港口先	砂混じり粘土	緑灰色	なし	27.0	51.2	9.3	0.7	26.0	0.057
播 磨 海 域 (5)	大塩港内	砂混じりシルト	緑灰色	微硫化水素臭	26.5	44.1	7.3	0.3	21.5	0.039
播 磨 海 域 (6)	東部工業港内	シルト	黒緑色	硫化水素臭	24.2	60.6	11.4	1.2	34.8	0.013
播 磨 海 域 (7)	飾磨港内 1	シルト	黒緑色	硫化水素臭	26.5	52.4	9.9	1.2	30.8	0.034
播 磨 海 域 (8)	広畑港内	シルト	黒緑色	硫化水素臭	24.6	54.4	10.6	1.5	31.1	0.017
播 磨 海 域 (9)	網干港内	シルト	黒緑色	硫化水素臭	26.0	55.3	11.2	1.0	33.7	0.038
播 磨 海 域 (10)	材木港内	シルト	黒色	硫化水素臭	25.4	53.5	11.0	1.8	40.7	0.016
播 磨 海 域 (11)	二見港沖	砂質	茶色	なし	26.9	19.4	3.3	<0.1	1.0	<0.001
	別府港沖	砂質	茶色	なし	27.5	20.6	2.7	<0.1	1.6	<0.001
	高砂西港沖	シルト混じり砂	緑灰色	なし	27.0	23.2	2.4	0.2	3.7	0.006
	白浜沖	砂混じり粘土	緑灰色	微硫化水素臭	25.5	51.4	9.2	0.5	23.7	0.012
	飾磨港沖	シルト	緑灰色	なし	25.2	53.3	10.3	0.4	27.6	0.014
	網干港沖	砂貝殻混じりシルト	緑灰色	なし	26.0	46.9	9.2	0.4	20.4	0.016
播 磨 海 域 (12)	明石港沖	砂質	緑褐色	なし	27.8	19.3	1.8	<0.1	1.5	<0.001
播 磨 海 域 (13)	明石林崎沖	砂質	茶色	なし	26.0	17.3	2.8	<0.1	<0.5	<0.001
	別府港沖合	砂質	茶色	なし	26.6	19.5	3.1	<0.1	<0.5	<0.001
	東部工業港沖合	粘土混じりシルト	緑灰色	なし	24.0	56.7	10.7	0.5	25.5	0.009
	揖保川河口沖	粘土混じりシルト	緑灰色	硫化水素臭	25.3	51.9	10.1	0.4	24.6	0.015
	家島本島南沖	砂混じりシルト	緑灰色	なし	25.0	49.2	8.4	<0.1	18.9	0.006
播 磨 灘 北 西 部	赤穂市中央部沖	シルト混じり粘土	緑灰色	なし	27.0	52.9	9.9	0.3	22.9	0.004
	赤穂市東部沖	粘土混じりシルト	緑灰色	硫化水素臭	26.3	61.7	11.5	0.8	27.6	0.007
	相生湾口	砂混じりシルト	緑灰色	硫化水素臭	26.5	56.2	11.6	<0.1	25.6	0.024
	加里屋川河口	砂混じり粘土	黒緑色	微硫化水素臭	28.1	41.0	7.6	<0.1	17.8	0.002
淡 路 島 西部南部	淡路市浜沖	小石混じり砂	茶色	なし	27.4	18.9	2.5	<0.1	0.8	<0.001
	淡路市撫沖	砂質	緑褐色	なし	27.4	25.0	2.3	<0.1	2.4	0.004
	南あわじ市慶野沖	シルト	緑灰色	微硫化水素臭	24.8	49.8	8.8	0.2	20.2	0.010
	南あわじ市鳥取沖	砂質	灰色	なし	26.8	21.6	2.8	<0.1	1.5	<0.001
	南あわじ市白崎沖	粘土混じり砂	緑灰色	なし	20.8	25.7	3.3	<0.1	3.8	0.002

第7-34表 海域底質測定結果2(平成20年度)

平成20年8月

河 川	地 点 名	水分量 (%)	強熱減量 (%)	Pb (μ g/g)	Cu (μ g/g)	Cd (μ g/g)	Zn (μ g/g)	As (μ g/g)	Mn (μ g/g)	Ni (μ g/g)	T-Cr (μ g/g)	T-Hg (μ g/g)	備 考
播磨灘	二見港沖	20.9	2.0	10.7	4.1	0.4	31.4	5.6	306	11.6	8.4	0.02	