

84 ササゴイ

(ペリカン目)

兵庫県ランク: C

Butorides striata

繁殖個体群:C 越冬個体群:無 通過個体群:C

環境省ランク:

種の概要

シベリア東部、中国東部、朝鮮半島、日本、アジア南部、オーストラリア、ポリネシア、西アフリカの熱帯域、南アメリカなどに繁殖分布し、北方のものは繁殖後暖かい地方に渡る。日本では本州、四国、九州で繁殖する。繁殖後は南方に渡るが、一部は沖縄で越冬する。平地の河川や池沼に生息し、小魚やカエル類、エビ類、昆虫類など水辺の小動物を食べる。河畔林や社寺林などの大木に集団で営巣する。

国内分布

北海道、天売島、本州、飛島、佐渡、舩倉島、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甕島列島、宇治群島、草垣群島、種子島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、硫黄列島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島



写真提供：森田俊司

(性別：不明)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★相生市、豊岡市、★加古川市、★赤穂市、西脇市、★宝塚市、三木市、★高砂市、川西市、小野市、★三田市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、★加東市、★たつの市、★稲美町、香美町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ ぐら 休息 環境・	局 地的 繁殖	希 少
○	○	○			○			○	

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に3-11月に生息し繁殖する。古くは神戸市の湊川神社や花隈神社のイチョウの大木、阪神間や播磨町の松林で多数繁殖していたが、営巣木が失われ急減した。最近では、河川敷や堤防などの小高木で単独や少数集団の営巣が見られる程度である。

保護上の留意点

生息環境である田圃、湖沼、河原、河口などの保全と営巣地となる海岸林や近くの松林、河川堤防や河川敷の林や小高木の保全が必要。