

138 オオルリ

(スズメ目)

Cyanoptila cyanomelana

兵庫県ランク: 注

繁殖個体群:注 越冬個体群:無 通過個体群:注

環境省ランク:

種の概要

シベリア南東部から中国北東部、朝鮮半島、日本などで繁殖し、繁殖後は熱帯アジアに渡る。日本では九州以北で繁殖する。丘陵地から山地の沢沿いの広葉樹林や針広混交林に生息し、崖の窪みや樹洞などに碗型の巣を造り営巣する。建物の軒に造ることもある。飛んでいる昆虫類をフライングキャッチして食べる。春秋の渡りの時期は、平地から低山の林に生息する。

国内分布

北海道、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甌島列島、宇治群島、草垣群島、上三島諸島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、硫黄列島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★西脇市、★宝塚市、★三木市、★高砂市、★川西市、★小野市、★三田市、★加西市、★丹波篠山市、★養父市、★丹波市、★南あわじ市、★朝来市、★淡路市、★宍粟市、★加東市、★たつの市、★猪名川町、★多可町、★稲美町、★神河町、★太子町、★上郡町、★佐用町、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ 特殊 ら休 息環 境・	局 地的 繁殖	希 少
					○	○			

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に4-10月に生息し繁殖する。繁殖場所である丘陵から山間の落葉広葉樹林の減少に伴い、近年は個体数が減少している。古くには平地の社叢林でも繁殖例がある。春秋の渡りの時期には、自然環境の残る落葉広葉樹を含む林があれば平地の都市緑地にも生息する。都市における樹林地の自然再生の指標種としても大切である。

保護上の留意点

山地から丘陵地、平地における自然環境の残る落葉広葉樹林の保全・再生が重要。



写真提供：北野光良

(性別：オス)



写真提供：北野光良

(性別：メス)