

## 8 オシドリ

(カモ目)

兵庫県ランク: B

*Aix galericulata*

繁殖個体群:B 越冬個体群:C 通過個体群:C

環境省ランク: DD

### 種の概要

シベリア南東部から中国東部、朝鮮半島、日本の本州北部以北などで繁殖し、繁殖後は中国南部、日本の本州中部以南、台湾などに渡る。本州中部以南でも山地では繁殖するところがある。繁殖期は山地の溪流で生活し、森林の樹洞で営巣する。冬は岸を林が覆っている湖や池、河川などに移動し、群れで生活する。ドングリを好んで食べる他、穀類や水生植物、小動物などを採食する。

### 国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州北部、飛島、本州中・南西部、佐渡、舩倉島、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甌島列島、種子島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

### 県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★伊丹市、相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★宝塚市、★三木市、★川西市、★小野市、★三田市、加西市、★丹波篠山市、★養父市、★丹波市、★南あわじ市、朝来市、★淡路市、★宍粟市、★加東市、たつの市、★猪名川町、★稲美町、★神河町、太子町、★香美町、★新温泉町

### 主要な選定理由

影響の人為性				生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性		
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ ぐら 休息 環境・	局 地的 繁殖	希 少
					○	○		○	

### 県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に10-翌4月に生息するが、宍粟市や丹波市、豊岡市、香美町の山間の溪流や池では、巣や雛は確認されていないものの、夏の繁殖期にも比較的観察記録がある。繁殖している可能性は高いが、極めて局地的で個体数は少ない。冬期は大陸からの越冬個体群が加わるため、個体数は増加する。

### 保護上の留意点

繁殖地となる山間地水辺の洞がある古木とシイ、カシ類などドングリとなる広葉樹の保全、および人為圧の除去が重要。越冬地については山間地のダム湖や湖沼の堤に、人が近づけない広葉樹の群落の確保が重要。



写真提供：梅津節雄

(性別：オス(左)、メス(右))



写真提供：鳥田陽子

(性別：メス(左)、オス(中・右))