

1 コクガン

(カモ目)

Branta bernicla

兵庫県ランク: 注

繁殖個体群:無 越冬個体群:注 通過個体群:注

◎天然記念物


環境省ランク: VU

種の概要

ロシア中北部、シベリア北東部、アラスカ、カナダ北部、グリーンランド、スピッツベルゲン島など北極圏で繁殖する。繁殖後はヨーロッパ中部や中国、朝鮮半島、日本、北アメリカの海岸などに渡り、越冬する。日本には秋に渡来し、主に北海道から本州北部で越冬する。本州中・南西部、四国、九州にも不定期に渡来し越冬する。海上や海岸の荒磯、海岸の浅瀬、河口、干潟に生息し、アマモやアオサなどの海藻類を好んで採食する。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、本州北部、佐渡、舩倉島、本州中・南西部、隠岐、見島、四国、九州、対馬、五島列島、伊豆諸島、小笠原群島、奄美大島、琉球諸島、南大東島




写真提供: 鳥田陽子

(性別: 不明)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

姫路市、★明石市、★西宮市、★洲本市、芦屋市、豊岡市、加古川市、赤穂市、高砂市、★淡路市、たつの市、★新温泉町



写真提供: 鳥田陽子

(性別: 不明)

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性の 低下	特殊競争 圧	特殊捕食 圧	特殊繁殖 環境	特殊採餌 環境	ね特殊ら ぐ特殊休 息環境・	局地的 繁殖	希少
○	○	○				○	○		○

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に12-翌4月に記録がある。古くは1910年代に芦屋沖で数羽群、1931-1932年に明石市で6-7羽群、1935年頃姫路市飾磨沖で数羽群など。近年では1972年豊岡市3羽、1989年西宮市2羽、1996年赤穂市1羽、2000年と2003年明石市1羽、2005年加古川市、2010年たつの市1羽の記録がある。最近では2014年に淡路市と洲本市、2019年に西宮市と新温泉町などの記録がある。

保護上の留意点

自然豊かな干潟や藻場が広がる海岸の浅海域の保全・再生が重要。