

## 39 コオバシギ

(チドリ目)

兵庫県ランク: B

*Calidris canutus*

繁殖個体群:無 越冬個体群:無 通過個体群:B

環境省ランク:

### 種の概要

シベリア東部からアラスカ、カナダ、グリーンランドなどの北極ツンドラで繁殖し、繁殖後はヨーロッパ西部、アフリカ南部、オーストラリア、南アメリカ南部などに渡り、越冬する。春秋の渡りの時期に日本各地に渡来する。干潟や河口、入り江、砂浜の海岸などに生息し、ゴカイ類、貝類、甲殻類などを採食する。

### 国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、本州、舩倉島、竹島、見島、四国、九州、対馬、男女群島、硫黄列島、奄美諸島、琉球諸島



写真提供：北野光良

(性別：不明)

### 県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、姫路市、尼崎市、★明石市、★西宮市、相生市、加古川市、★高砂市、たつの市、稲美町

### 主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ね特殊 ぐら休 息環 境・	局 地的 繁 殖	希 少
	○	○				○	○		

### 県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では主に4-5月と9-10月に記録がある。主に県南部で記録されるが、大抵は単独か数羽で、個体数は少ない。近年、生息環境の多くが消滅した。最近では稀に観察される程度になっている。

### 保護上の留意点

現在もわずかに残されている干潟や河口などの自然環境の保全に加えて、積極的な再生のための環境整備が重要。